

Euscorpium hadzii (Caporiacco, 1950)

Wpisany przez Jarek
poniedziałek, 28 lutego 2011 15:14



Występowanie: Albania, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Macedonia, Kosowo, Czarnogóra i Serbia.

Środowisko naturalne: Zamieszkuje otwarte tereny a także lasy, gdzie ukrywa się pod kamieniami, gałęziami, w zaroślach. Często kopie nory.

Wielkość: Osiąga wielkość w granicach 3-3,5 cm.

Wygląd: Kolor zróżnicowany od jednolitego czarnego do jasno brązowego. Ciemniejszy kolor przybierają pedipalpy wraz z prosomą. Nieco jaśniejszy mesosoma, metasoma. Odnóża oraz telson mogą widocznie jaśniejsze popadające niekiedy w żółty.

Jad: Gatunek słabo jadowity, nie jest niebezpieczny dla zdrowia człowieka. Do ukłucia dochodzi bardzo rzadko. Może spowodować jedynie lekkie swędzenie, zaczerwienienie.

Przebieg życia: Dojrzewa przeważnie po 5-6 wylinkach, czyli wieku L6-7. Młode dorastają po około półtora roku.

Warunki hodowlane

Terrarium: 12x12 cm jest wystarczającą wielkością dla jednego a nawet pary dorosłych tego gatunku. Młode możemy trzymać w pojemnikach po kliszy fotograficznej, pojemnikach na mocz, oraz podobnych. W ściankach należy zrobić otwory adekwatne do wielkości osobnika. Umieścić w nim możemy płaski kamień, kawałek kory czy liście - dla zapewnienia schronienia podopiecznemu.

Temperatura: Wystarczającą temperaturą dla tego gatunku będzie 20-25°C, z nocnym spadkiem o kilka stopni. W środowisku naturalnym przeżywają w dużo niższych temperaturach, więc nie należy się martwić jeśli przez parę dni nie możemy im zagwarantować wyższej temperatury.

Wilgotność: 60-80%. Dla zapewnienia tej wilgotności możemy utrzymywać całe podłoże lekko wilgotne. Dodatkowo możemy umieścić niewielkie naczynie z wodą.

Podłoże: Najodpowiedniejsza będzie mieszanka torfu (lub włókna kokosowego) z piaskiem i gliną. Grubość około 5 cm.

Rozpoznawanie płci: Samce posiadają grubszy telson, oraz widoczną szczerbę pomiędzy palcami szczypiec. Samice posiadają 7-9 zębów na pektynach, samce 7-11.

[Czytaj dalej...](#)

Rozmnażanie: Skorpiony te nie przejawiają agresji w stosunku do siebie, mogą żyć w

Euscorpius hadzii (Caporiacco, 1950)

Wpisany przez Jarek
poniedziałek, 28 lutego 2011 15:14

większych grupach. Samice wydają młode dwa razy w roku, w ilości nie przekraczającej 30 sztuk.

Uwagi: Polecany dla początkujących hodowców. Gatunek bardzo spokojny, nieprzejawiający agresji.

Bibliografia:

- Fet, F. & Soleglad, M.E. 2002. *Morphology Analysis Supports Presence of More Than One Species in the "Euscorpius carpathicus" Complex (Scorpiones: Euscorpiidae)*. Euscorpius. 2002, No. 3.

- Teruel, R. Fet, V. & de Armas, L.F. *A Note on the Scorpions from the Pirin Mountains, Southwestern, Bulgaria (Scorpiones: Buthidae, Euscorpiidae)*. Euscorpius. 2004, No. 14.

```
function call(){ google.load('visualization', '1', {'packages': ['geochart'],
'callback':call}); google.setOnLoadCallback(drawRegionsMap); function
drawRegionsMap() { var data = new google.visualization.DataTable();
data.addRows(7); data.addColumn('string', 'Country'); data.addColumn('number',
'Wiarygodnosc [%]'); data.setValue(0, 0, 'Albania'); data.setValue(0, 1, 100);
data.setValue(1, 0, 'Bosnia and Herzegovina'); data.setValue(1, 1, 100);
data.setValue(2, 0, 'Bulgaria'); data.setValue(2, 1, 100); data.setValue(3, 0, 'Croatia');
data.setValue(3, 1, 100); data.setValue(4, 0, 'Macedonia'); data.setValue(4, 1,
100); data.setValue(5, 0, 'Kosovo'); data.setValue(5, 1, 100); data.setValue(6, 0,
'Montenegro and Serbia'); data.setValue(6, 1, 100); var options = {}; var container
= document.getElementById('map_canvas'); var geochart = new
google.visualization.GeoChart(container); geochart.draw(data, {width: 800, height: 500,
colors: ['#BDF590','#267114'], region: '150'}); };
```